

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (H31.3.)

(有) 丸 富

2月は比較的暖かい日が多く、春の訪れを感じさせる天候だった。日中のハウス内は暑いくらいに気温が上がることもあり、ダニ、スリップス、アブラムシの発生も多かった。着果負担により、なり疲れしたところもあった。

病害対策

新月頃、曇雨天が続き、低気圧になると、病害の発生が多くなる。病害に強い緑化葉を形成する。健全な株育成に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000~5,000 倍**を葉面散布する。

着(花)果促進

樹勢低下や日照不足下では花(花粉)が弱く、着(花)果が悪い。光合成を促進して、着(花)果を促進する。着(花)果促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を3~5回連続で、葉面散布する。果実や茎葉の充実促進に**時を越えた贈り物 500 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

品質向上

光合成能力の高い株が、高品質で多収穫を実現し、高い生産性を生み出す。品質向上に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時、葉面散布する。高品質多収穫に**笑顔 100 cc(又は天地の恵み 300 cc)/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**を随時灌水する。

発根促進

根の質(直根と細根のバランス)が大事。収穫量は根の量(根域の大きさ)に比例して増える。活力ある根の維持に**天地の恵み(又は発根力)1,000 倍**と**GバランスDF 5,000 倍**を30日毎に灌注する。灌水で**天地の恵み(又は発根力)500 cc/10a**と**GバランスDF 0.5 kg/10a**を15~20日毎に灌水する。

害虫対策

満月頃は、害虫が繁殖しやすい。害虫の動向を注意深く観察し、事前対応で予防する。害虫が発生する前に、ハウス内への飛び込みや繁殖の予防に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を散布する。害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み	200~500g/10a	} 5日毎に灌注する場合 ※生育状況によって加減する。
サンミネーラ	50~100g/10a	
プロ液肥	2~3 kg/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~200 cc、海藻のエキス 50 cc、イロークリーン(微量要素) 200 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)