

アスパラガス栽培管理(R2.6.)

(有) 丸 富

5月は風が強い日が多く、気温も激変して、朝晩は冷たく、朝の収穫量は減少した。しかし、日中は夏のように暑く、時々前線を伴った低気圧が通過する際、激しい雨が降った。スリップスなど害虫が多かった。

夏芽後に

夏芽の収穫が始まったら、側枝やぎ葉が発生して過繁茂にならないよう、気をつける。
夏芽後に**酸カル 300 cc(又は天然ミネラル 500 cc) / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a** 灌水する。

品質向上

養分バランスの乱れによって曲がりや偏平は生じる。日頃から養分バランスを考えて、肥培管理を行う。
品質向上に**天然ミネラル 200 cc / 10a**と**酸カル 100 cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を灌水する。

発根促進

ピッチ後は根の働きを活発にするために、定期的に発根と吸収根の維持を行う。
発根と吸収根の維持に**GバランスDF 0.5 kg / 10a**と**発根力 0.5 ℓ(又は天地の恵み 0.2 ℓ) / 10a**を、2~3週間ごとに灌水する。

緑化促進

高温多湿にも葉が耐えて、活発に光合成するよう、茎葉の緑化を促す。
緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。
転流促進に**シリカアップ 100cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を液肥灌水時に混用する。

害虫対策

スリップスが特に多い時期は防除だけでは抑えにくいので、害虫が嫌う忌避剤などと併用して対応する。
また、樹勢低下すると、ダニが繁殖するので、できる限り樹勢を維持する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc / 10a**又は**ストッパー雅 200cc / 10a**を3~5日毎に灌水する。

病害対策

梅雨時期は蒸れないように通気性や換気に気をつけて、天候に応じたハウス環境を整える。
健全な株の育成に**サンミネーラ 2,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**を7~10日毎に葉面散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	3~5 ℓ / 10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc / 10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc) / 10a	
ストッパー雅(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc) / 10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)