

いちご栽培管理 (R6.7.)

(有) 丸 富

6月は例年より梅雨入りが遅く、前半は太陽活動が活発な状態が続き、比較的天気良く、高温になることもあり、害虫の発生が多かった。後半は梅雨入りして曇天や大雨になることが多かった。

害虫対策

近日点では害虫の繁殖が盛んになる。苗床の周りから害虫が侵入することがあるので、周辺環境にも注意する。

周辺から侵入する害虫対策に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a**を散水・灌水し、害虫対策を行う。
害虫の繁殖抑制に**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用する。

病害対策

梅雨で曇天が続くと、光合成が低下するので、窒素が残り、**かべ**など病害の発生が多くなる。

細胞壁強化と窒素消化促進に**酸カル 2,000~3,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を防除時に混用する。

不時出蕾対策

すけポットの場合、親苗からランナーを切り離す際、肥料が切れると花芽分化するので、不時出蕾になる。ランナーを切り離す**5~7日前**に置き肥を行い、肥料が効いてからランナーを切り離す。

切り離し前に**笑顔 1,000倍(又は、天地の恵み 500倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。

発根促進

ランナーが活着したら、細根の働きが良くなるように、水管理と酸素供給を行う。

発根促進に**G バランス DF 5,000倍**を2~3週間ごとに、灌注、又は散水する。

芽なし対策

近日点では定植前に肥料切れすると、芽なしになりやすいので、肥培管理に細心の注意を払う。

芽なし対策に**天地の恵み 500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を灌注、散水する。※肥料切れする前に。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	500~1,000倍
時を越えた贈り物(又は、天地の恵み)	2,000~3,000倍
サンミネーラ	10,000倍
バイオアクトTS	5,000~10,000倍

5~7日毎に灌注、散水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに

シカアップ 5,000倍、天然ミネラル 2,000~3,000倍、海藻のエキス 5,000~10,000倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)