

# いちご栽培管理 (R6.8.)

(有) 丸 富

今年は例年より梅雨入りが13日遅かったけど、梅雨明けは3日遅いくらいで、弊社周辺では幸い大きな災害に至らず、無事でよかった。太陽活動は活発な状態が続き、日差しが強く酷暑になって、作物はゆっくりと生長した。

## 発根促進

定植時に活着しやすいように、株冷・夜冷に入庫する前や定植する5~7日前に、酸素供給を行う。  
夜冷・株冷の入庫前に**GバランスDF 5,000倍**を灌注、又は散水する。

## 芽なし対策

定植前後に肥料切れすると、芽なし株になりやすいので、肥培管理に注意する。  
芽なし対策に**天地の恵み 500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を株冷入庫前に、灌注、又は散水する。

## 花芽分化促進

光合成を促進して、C/N比を上げ、花芽分化を促す。樹勢を維持したまま、花芽分化させる。  
花芽分化する15~20日前から**笑顔 1,000倍**(又は、**バイオシャインシルバー 2,000倍**)と**サンミネーラ 10,000倍**を2~3回散布する。

## 害虫対策

近日点では作物の樹勢が低下しやすいので、害虫の発生が盛んになる。苗床の周りから害虫が侵入することがあるので、周辺環境にも注意する。  
周辺から侵入する害虫対策に**バイオアクトTS 50~100cc/10a**を散水・灌水し、害虫対策を行う。  
害虫の繁殖抑制に**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用する。

## 病害対策

台風や前線を伴った低気圧が通過すると、水と同時に窒素を吸収し、窒素過多になるので、病害の発生が多くなる。  
細胞壁強化と窒素消化促進に**酸カル 2,000~3,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を防除時に混用する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	500~1,000倍
時を越えた贈り物(又は、天地の恵み)	2,000~3,000倍
サンミネーラ	10,000倍
バイオアクトTS	5,000~10,000倍

5~7日毎に灌注、散水する場合  
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに

シリアップ 5,000倍、天然ミネラル 2,000~3,000倍、海藻のエキス 5,000~10,000倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)