

# いちご栽培管理 (R6.10.)

(有) 丸 富

9月は概ね太陽活動が活発な状態が続き、記録的な猛暑で害虫が発生した。台風や秋雨前線の通過により、全国的に大雨が降った。その後、朝晩が冷えてきたので、お彼岸頃から彼岸花が咲き始め、花芽分化が進んだ。

## 活着促進

定植後、活着を促進するように、定植前後に灌注、又は散水する。

定植前に **Gバランス DF 5,000倍** を灌注、又は散水する。

定植後、活着促進に **天地の恵み 1,000倍** と **サンミネーラ 10,000倍** を2回灌注、又は **天地の恵み 0.5~1ℓ / 10a** と **サンミネーラ 50~100 cc / 10a** を2回散水する。

## 害虫対策

満月頃にはヨウムシなど害虫の発生が盛んになる。ハウスの周りから害虫が侵入するので、注意する。

周辺から侵入する害虫対策に **バイオアクトTS 50~100 cc / 10a** を散水・灌注し、害虫対策を行う。

害虫の繁殖抑制に **バイオアクトTS 2,000~3,000倍** を防除時に混用する。

## 腋(二番)花房の花芽分化促進

光合成を促進して、C/N比を上げ、腋(二番)花房の花芽分化を促進する。

腋花房が花芽分化する1~2週間前から **時を越えた贈り物 500倍(又は、バイオシャインシルバー 2,000倍)** と **サンミネーラ 5,000倍** を2~3回散布する。

## 病害対策

台風や前線を伴った低気圧が通過し、大雨が降ると、窒素過多になるので、病害の発生が多くなる。

窒素消化に **時を越えた贈り物 1,000倍** と **酸カル 2,000倍** と **サンミネーラ 5,000倍** を防除時に混用する。

## 生育促進

腋(二番)花房の花芽分化後は、早く展開するように、光合成する葉面散布などで、生育を促進する。

生育(展開)促進に **笑顔 1,000倍(又は、天地の恵み 500倍)** と **サンミネーラ 10,000倍** を葉面散布する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

**プロ液肥 1,000~2,000倍**

**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 2,000~3,000倍**

**サンミネーラ 10,000倍**

**バイオアクトTS 5,000~10,000倍**

※サンミネーラの代わりに

シリアップ 5,000倍、天然ミネラル 2,000~3,000倍、海藻のエキス 5,000~10,000倍でもよい。

5~7日毎に灌注、散水する場合  
※状況に応じて加減する

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)