

野菜(トマト・ナス)栽培管理

(R6.11.)

(有)丸富

10月は太陽活動が時々活発になり、暑い日が多くなった。ヨウムシ、コナジラミなど害虫の発生が多くなった。台風や秋雨前線の通過により、ところにより大雨が降った。朝晩は冷えても、日中は気温が高かった。

病害対策

遠日点では細根の働きが悪いので、微量元素などの吸収が悪い。窒素過多になると、病害が多くなる。
窒素消化に**時を越えた贈り物(オリゴファイト)2,000倍と酸カル2,000倍とサンミネーラ5,000倍**を散布する。

品質向上

遠日点の新月後は、特に栄養生長傾向になるので、花が弱く、品質が下がる。

根の働きが良い時は**酸カル50~100cc/10aと天然ミネラル100~200cc/10aとサンミネーラ50cc/10a**を灌水で与える。根の働きが悪い時は、葉面散布で必要な養分を与える。

肥大促進

着果負担が大きくなると、養分の競合が起こるため、果実の肥大が悪くなる。

果実の肥大促進に**天地の恵み1,000倍と酸カル2,000倍とK-404,000倍とサンミネーラ10,000倍**を散布する。又は、**天地の恵み200cc/10aと酸カル100cc/10aとK-40250g/10aとサンミネーラ50cc/10a**を灌水時に混用する。

根張り促進

細根が活発に働いているなら、根から養分を与える。

根張り促進に**GバランスDF1kg/10aとサンミネーラ50~100cc/10a**を30~40日毎に灌水する。

害虫対策

満月頃は害虫の繁殖が盛んになるから、害虫の発生に注意して管理を行う。

害虫の事前対策に**バイオアクトTS50~100cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

防除時に**バイオアクトTS2,000~3,000倍**を混用散布する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	100~200cc/10a	5~7日毎に灌水する場合 ※生育状況によって加減する。
サンミネーラ	50~70cc/10a	
酸カル(又は天然ミネラル)	50~100cc/10a	

バイオアクトTS 50~70cc/10a

※サンミネーラの代わりに、シリカアップ[®]100~150cc、シーマロックス500~1000cc、海藻エキス50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)