

アスパラガス栽培管理 (R6.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は太陽活動が活発で、暑い日が多く、台風の発生が多かった。温度が高く遅くまで若茎が出た。後半は冷え込んだが、曇天が多く、晴れた日は日差しが強かった。ヨウムシなどの害虫被害が多かった。

病害対策

欠株や罹病株がある場合は病害が拡大しないよう、腐った根株を取り除く。取り除いた根株の所に、**ハイプロを土に 10%混和**したものを埋め戻す。

土壌中のミネラルバランスと微生物相の改善に**農業用植物マグマ黒末 1~2 kg/10a**を土壌撒布する。その後、灌水時に**酸カル 50~100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を混用する。

全刈り

秋の気温が高く、休眠に入るのが遅く、貯蔵養分の蓄積ができていないので、低温に出来る限り遭遇させて、貯蔵養分を蓄積してから、全刈りを行う。

バーナー焼却

ハウス内の殺虫殺菌のために、バーナーで焼却する。今期は害虫の発生が多かったので、土壌表層で越冬する害虫（卵、幼虫、成虫）を焼却して殺虫する。殺虫ができていないと、保温後に害虫の発生が多くなる。

土壌の管理

畝の上の土壌をかき落とし、堆肥や肥料と混和して、土づくりを行う。土壌分析を実施して、土壌に不足している必要なものを投入する。

害虫対策

害虫やネミ、モグラの発生を事前に予防する。早め（事前）の対策が大切。

害虫、モグラ、ネミ対策に**バイオアクト TS 50~70 cc/10a(又は、ストップパ-雅 100~200 cc/10a)**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 1~2 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップパ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)