# 菜(トマト・ナス)栽培管理(R6.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は太陽活動が活発で、暑い日が多く、台風の発生が多かった。後半は冷え込んだが、曇天が多く、 晴れた日は日差しが強かった。コナジラミ、スリップス、ダニなどの被害が多く、全体的に根張りが悪かった。

### 根張り促進

根の働きを活発にして、根から養分を与える。

根張り促進に G バランス DF 1 kg/10a と天地の恵み 0.5 Q(発根力 1Q)/10a を 1 ヶ月毎に潅水する。

# 害虫対策

害虫の繁殖が盛んになる前に、害虫の発生を事前対応で予防する。

害虫の事前対策にバイオアクトTS 50~100 cc/10a を 5~7 日毎に潅水する。

防除時に**バイオアクト TS 2.000~3.000 倍**を混用散布する。

## 病害対策

細根の働きが悪い時は、特に微量要素などの養分吸収が悪い。窒素過多になると、病害が多くなる。 窒素消化に**時を越えた贈り物(オリコヴァイト)2.000 倍と酸カル 2.000 倍とサンミネーラ 5.000 倍を**散布する。

#### 品質向上

曇天が多いと、日照不足になり、光合成が低下する。特に新月後は栄養生長傾向になるので、光合成 産物が少ないと、花が弱く、着色が遅れ、品質が下がる。

根の働きが良い時は**酸カル 50~100 cc / 10a** と**天然ミネラル 100~200 cc / 10a** とサンミネーラ 50 cc / 10a を潅水で与える。根の働きが悪い時は、笑顔 1,000 倍とサンミネーラ 10,000 倍を連続で葉面散布する。

# 肥大促進

着果負担が大きくなると、養分の競合が起こるため、果実の肥大が悪くなる。

果実の肥大促進に天地の恵み 1.000 倍と酸カル 2.000 倍と K-40 4.000 倍とサンミネーラ 10.000 倍を 散布する。又は、天地の恵み 200 cc/10a と酸カル 100 cc/10a と K-40 250g/10a と サンミネーラ 50 cc / 10a を潅水時に混用する。

# 追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a サンミネーラ 50~70 cc/10a 酸カル(又は天然ミネラル) 50~100 cc/10a

50~70 cc / 10a

5~7日毎に潅水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シリカアップ 100~150 cc、シーマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

バイオアクト TS

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)