

# アスパラガス栽培管理(R7.1.)

(有) 丸 富

12月は太陽活動が活発で、朝晩の冷え込みは厳しいが、晴れた日は日差しが強く、温度が上がった。秋が高温だったため、若莖がいつまでも出たので、黄化が遅れ、枯れ込みが遅れたところが多かった。

## 全刈り

休眠に入るのが遅かったため、貯蔵養分の蓄積ができていないところが多く、低温に出来る限り遭遇させて、貯蔵養分を蓄積してから、全刈りを行う。

## バーナー焼却

今期は害虫の発生が多かったので、土壌表層で越冬する害虫（卵、幼虫、成虫）をバーナーで焼却して殺虫殺菌する。殺虫殺菌ができていないと、保温後に病害虫の発生が多くなる。

## 病害対策

欠株や罹病株がある場合は病害が拡大しないよう、腐った根株を取り除く。取り除いた根株の所に、**ハイプロを土に10%混和**したものを埋め戻す。

土壌中のミネラルバランスと微生物相の改善に**農業用植物マグマ黒末 1~2 kg/10a**を土壌撒布する。その後、灌水時に**酸カル 50~100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を混用する。

## 土壌の管理

土壌分析を行い、土壌に不足している成分を必要なだけ投入する。畝の上の土をかき落とし、堆肥や肥料と混和して、土づくりを行う。

## 蒸し込み前

土づくり、畝上げが終わったら、たっぷりと灌水し、天気を見計らって蒸し込む。蒸し込み直前に**天地の恵み 0.5~1 ℓ/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	0.5~1 ℓ/10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS(又はストップ-雅)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)