

# アスパラガス栽培管理(R7.2.)

(有)丸 富

1月は朝晩の冷え込みは厳しいものの、降水量が少なかった。晴れた日は日差しが強く、温度が上がった。黄化が遅れ、枯れ込みが遅かったので、全般的に作業工程が遅れていた。

## 蒸し込み前

蒸し込みの準備が終わったら、最後にたっぷりと灌水し、天気を見計らって蒸し込む。  
蒸し込み直前に**天地の恵み 0.5~1ℓ/10a**と**サンミネーラ 50~100cc/10a**を灌水する。

## 伸長促進

萌芽が始まり、若茎が出揃ったら、若茎が早く生長するように、若茎に直接養分を与え、伸長を促す。  
伸長促進に**笑顔 1,000倍(天地の恵み 500倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。

## 品質向上

地温が上がると若茎の生長が早く、養分吸収も良くなるので、養分バランスを考慮した追肥を施す。  
品質向上に**天地の恵み 200cc/10a**と**酸カル 100cc/10a**と**サンミネーラ 50cc/10a**を液肥に混用して灌水する。

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなるので、注意して観察を行う。害虫の発生が多くなると、ハウス外から害虫の侵入が多くなるので、ハウス周辺の環境に気をつける。  
事前の害虫対策に**バイオアクト TS 50~100cc/10a(又は、ストップ-雅 200~300cc/10a)**を5日毎に灌水する。  
その後、防除時に**バイオアクト TS 2000~3000倍(又は、ストップ-雅 500~1,000倍)**を混用する。

## 発根促進

若茎の収穫量は昨年の貯蔵養分と根からの養分吸収で決まる。吸収根(細根)の働きに左右される。  
発根促進に**天地の恵み 500cc/10a**と**Gバランス DF 1kg/10a**を30~45日ごとに灌水する。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	0.5~1ℓ/10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	100~200cc/10a	
サンミネーラ	50cc/10a	
バイオアクト TS(又はストップ-雅)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150cc、シマロックス 500~1000cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942-65-0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)