

# アスパラガス栽培管理(R7.4.)

(有) 丸 富

3月は暑さ寒さも彼岸までと言われるが、前半は冬のように冷え込み、後半は夏のように暑くなった。近日点でアザミウマ、ダニなど害虫の発生が多かった。暑くなってようやく収穫量が増えたが、価格が下がった。

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなる。ハウス周辺の環境変化(除草、防除)に気をつける。

事前の害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ-雅 200~300 cc/10a)**を5日毎に灌水する。

その後、防除時に**バイオアクト TS 2000~3000 倍(又は、ストップ-雅 500~1,000 倍)**を混用する。

## 品質向上

アスパラガスが好む養分を根が吸収するので、土壌養分が偏らないよう、バランスを考慮して、追肥(液肥)を施す。

品質向上に**天地の恵み 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネ-ラ 50 cc/10a**を液肥に混用して灌水する。

## 立茎前

昨年の貯蔵養分を考えながら収穫を行い、春芽を大まか採り終えたら、随時立茎を行う。

立茎前に**天地の恵み 500 cc/10a**と**サンミネ-ラ 50 cc/10a**を灌水する。

## 発根促進

吸収根(細根)の働きによって、若茎の収穫量が左右される。日頃から細根の働きを活発にする。

発根促進に**グリンスター 500 cc/10a**と**Gバランス DF 1 kg/10a**を30~45日ごとに灌水する。

## 立茎後

立茎を始めると、親茎の生長に養分を使うので、若茎の伸長が悪くなったり、若茎が細くなったりするため、収穫量が減少する。親茎の緑化を促し、光合成を促進する。

親茎の緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネ-ラ 10,000 倍**を葉面散布する。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

**プロ液肥** 2~3ℓ/10a

**時を越えた贈り物** 100~200 cc/10a

**サンミネ-ラ** 50 cc/10a

**バイオアクト TS(又はストップ-雅)** 50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネ-ラの代わりにシリアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)